

VACCUNAS REQUERIDAS PARA EL INGRESO ESCOLAR, GRADOS K-12

Julio 1, 2012 – Junio 30, 2013

VACUNA	Kínder-1 ^{er} Grado	2 ^o -4 ^o Grado	5 ^o -6 ^o Grado	7 ^o -12 ^o Grado
Hepatitis B	3 dosis			
Difteria, Tétanos, Tos ferina (DTaP/DT/Td/Tdap)	<p>5 dosis (4 dosis si la 4^{ta} dosis es administrada a partir de los 4 años)</p> <p style="text-align: center;"><i>además de</i></p> <p style="text-align: right;">requerirse 1 dosis de Tdap para estudiantes en los grados 6^o-11^o <u>SI</u> tienen 11 años o más de edad y han pasado 5 o más años desde que recibieron su última vacuna DTaP, DT o Td.</p>			
Polio (IPV o OPV)	<p>4 dosis (3 dosis si la 3^{ra} dosis se da a partir de los 4 años)</p> <ul style="list-style-type: none"> Toda dosis final administrada a partir del 7 de agosto del 2009, debe darse por lo menos a los 4 años de edad y con un mínimo intervalo de 6 meses a partir de la dosis previa. 	<p>4 dosis (3 dosis si la tercera dosis se da a partir de los 4 años)</p>		
Sarampión, Paperas y Rubéola	2 dosis			
Varicela	<p>2 dosis</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p>El proveedor de salud verifica que se padeció la enfermedad.</p>		<p>1 dosis</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p>Un padre de familia verifica que se padeció la enfermedad.</p>	<p>Recomendada pero no requerida.</p>

- Los requisitos de vacunación están sujetos a cambios pendientes de decisiones finales adoptadas por la Junta Directiva de Salud del Estado.
- Para información sobre la edad y espacio mínimos recomendados vea la tabla de *Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas* en la página 2.

Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas

Vacunas	Núm. de dosis	Edad mínima	Intervalo mínimo entre dosis	Notas
Hepatitis B HepB	Dosis 1	Nacimiento	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La dosis final de la serie debe darse a partir de las 24 semanas de edad. ▪ Administre 2 dosis si la vacuna Recombivax HB® para adultos es administrada entre las edades de 11 y 15 años con un espacio de 4 meses o más.
	Dosis 2	4 semanas	8 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	24 semanas	16 semanas entre dosis 1 y 3	
Difteria, Tétanos y Tos ferina DTaP/DT	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DTaP: para niños hasta la edad de 6 años. ▪ Se recomienda un espacio de 6 meses entre dosis 3 y 4, pero un espacio de 4 meses o más es aceptable.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 mese entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	6 mese entre dosis 4 y 5	
	Dosis 5	4 años	–	
Tétanos, difteria y tos ferina Tdap	Dosis 1	10 años (la edad mínima depende de la marca de vacuna)	–	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Boostrix®: autorizada para personas de los 10 años de edad en adelante. ▪ Adacel®: autorizada para personas de los 11 años de edad en adelante.
Tétanos y difteria Td	Dosis 1	7 años	5 años	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Td: para niños de los 7 años de edad en adelante. ▪ Se requiere 3 dosis de Td si comenzaron la seria después de los 7 años.
Polio IPV u OPV	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No es obligatoria para los estudiantes de 18 años de edad en adelante. ▪ Los niños que obtuvieron 3 o 4 dosis antes del 7 de agosto del 2009, no necesitan una dosis adicional. Si el niño recibió dosis antes del 7 de agosto del 2009, tiene que haber un intervalo mínimo de 4 semanas entre la dosis final de IPV y la previa.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 mese entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	4 años	–	
Sarampión, Paperas y Rubéola MMR o MMRV	Dosis 1	12 meses	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La vacuna MMRV (MMR + varicela) puede utilizarse en lugar de las vacunas MMR y varicela por separado. ▪ APLICA el periodo de gracia de 4 días entre dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo, como MMR/MMR o MMRV/MMRV. NO aplica el periodo de gracia de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de diferentes tipos, como entre MMR y Varicela o MMR e influenza atenuada.
	Dosis 2	13 meses	–	
Varicela VAR	Dosis 1	12 meses	3 mese entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se recomienda un espacio de 3 meses entre dosis de varicela, pero un promedio mínimo de 28 días es aceptable. ▪ Tiene que recibirse el mismo día que la vacuna MMR o por lo menos 28 días aparte (NO aplica el periodo de gracia de 4 días). ▪ APLICA el periodo de gracia de 4 días entre dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo, como VAR and VAR. NO aplica el periodo de gracia de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de diferentes tipos, como entre MMR y Varicela o MMR e influenza atenuada.
	Dosis 2	15 meses	–	

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (1-800-833-6388 relevador TTY).